

## Les repères pour gérer les prairies

Somme de températures cumulées depuis le 1er février (base 0°-18°)	250 à 350°C	500°C	700 à 800°C	1000°C	1200°C	1400°C	> à 1400°C
	Mise à l'herbe	Fin déprimage Épi à 5cm	Fauche précoce Épi à 10cm - Début épaïson	Foin précoce Début floraison	Foin moyen floraison	Foin tardif médiocre Début grainage	Grainage

### Les averses s'entremêlent aux fauches précoces

Sommes de T° depuis le 1 <sup>er</sup> février et pluviométrie depuis le 1 <sup>er</sup> janvier et les 10 derniers jours. Données Météo - France				
Au 30 avril				
Postes	Secteur	Cumul T°	Pluie mm	Pluie 10 j
GRANDCHAMP (180 m)	Puisaye	755	195	26,8
PERRIGNY (207 m)	Auxerre	791	173	23,1
SAINT MARDS (175 m)	Pays d'Othe	762	201	23,6
ST ANDRE EN TP (300 m)	Avallon	737	178	18
MORVAN (400m) données estimées	Quarré	684		
Au 29 avril				
TROYES (126 m)	Craie	740	156	12,4
METZ ROBERT (150 m)	Chaourçois	691	177	18,6
MATHAUX (130 m)	Briennois	767	160	17,6

Encore une semaine de régime d'averses, néanmoins scrutez la météo et soyez opportuniste afin de récolter vos fourrages en ensilage ou enrubannage sans trop attendre.

### Réseau de suivi de pousse de l'herbe

Pâturages suivis	Animaux pâturant	Hauteur d'herbe (cm)	Croissance (kgMS/Ha)
Saint Privé AB (89)	VL	11	40
Saint Privé (89)	VL	9	45
Diges (89)	VA	11,8	95
La Brosse (89)	VL	7,7	40
Soumaintrain (89)	VL	8,5	41
Vault de Lugny (89)	OV	7,2	82
Provency (89)	VA/OV	4,7	pâturage
Ste Magnance (89)	VA	5,7	30
St Thibault (10)	VL	11,1	88
Chauffour les Bailly (10)	VL	9,3	53

### Maïs après RGI ou méteils très précoce

Pour les structures avec fortes activités de **vers de terre** (= grumeleuses en surface) passez en **TCS** (Technique Culturelle Simplifiée) en priorité avec travail du sol superficiel et de décompactage. Profondeur de travail 15 à 40 cm et dilution de la matière organique de 0 à 20 cm de profondeur.



### Devez-vous débrayer une parcelle ?

Débrayer des parcelles consiste à les retirer des surfaces pâturées pour les faucher en ensilage ou enrubannage.

Pour faire votre choix, avant votre période propice de récolte faites le tour de vos parcelles à l'aide de votre herbomètre et/ou de votre œil aiguisé par l'expérience.

Si la hauteur herbomètre des parcelles à pâturer les 2 prochaines semaines se situe entre 8 et 9cm (correspondant à une hauteur d'herbe au niveau de votre cheville) → **Les repères du tableau suivant vous aideront dans le cas d'une pousse de l'herbe à 40kgMS/Ha/jour.**

Ares/UGB	50% herbe pâturée	100% herbe pâturée
15	Ne pas débrayer	Ne pas débrayer
20	Débrayer l'équivalent de 4 jours de pâturage	Ne pas débrayer
30	Débrayer l'équivalent de 13 jours de pâturage	Ne pas débrayer

Néanmoins, si certaines de vos parcelles destinées au pâturage ont une hauteur supérieur à 14 cm herbomètre (=hauteur à mi-bottes), préférez la fauche afin d'éviter le gaspillage.

### Semis de prairie après dérobée d'hiver

Différents choix selon le terrain d'implantation et la durée voulue :

- **RGI alternatif** 20 kg + **trèfle d'Alexandrie** 10 kg à semer avant le 20/05/19 pour une culture d'un an avec une exploitation possible à partir d'août en pâturage
- **Semis de légumineuses** : Luzerne 15 kg + trèfle incarnat 5kg (ou squarrosom) + trèfle violet 6kg + RGH 6 kg pour une durée de 3 ans
- **Semis de prairies multi-espèces** pour une durée de 4 ans avec un gain de production de 15 à 20% de MS/an quelle que soit le type d'année. Première exploitation en pâturage à la fin de l'été et à l'automne.