Alliance Expertise Élevage
Vous accompagner dans vos projets

Alysé
Pour la performance des éleveurs

INFO-FOURRAGES

13 Juin 2019

N° 12

Les repères pour gérer les prairies

Somme de températures cumulées depuis le 1er février (base 0°-18°)	250 à 350°C	500°C	700 à 800°C	1000°C	1200°C	1400°C	> à 1400°C
	Mise à l'herbe	Fin déprimage Épi à 5cm	Fauche précoce Épi à 10cm - Début épiaison	Foin précoce Début floraison	Foin moyen floraison	Foin tardif médiocre Début grainage	Grainage

Temps orageux toute la semaine

Sommes de T° depuis le 1er février et pluviométrie depuis le 1er janvier et les 10 derniers jours. *Données Météo - France*				
Au 10 juin				
Postes	**Secteur**	**Cumul T°**	**Pluie mm**	**Pluie 10 j**
GRANDCHAMP (180 m)	*Puisaye*	1276	282	23,8
PERRIGNY (207 m)	*Auxerre*	1330	254	10,8
SAINT MARDS (175 m)	*Pays d'Othe*	1285	295	20,8
ST ANDRE EN TP (300 m)	*Avallon*	1256	234	13,6
MORVAN (400m) *données estimées*	*Quarré*	1181		
Au 10 juin				
TROYES (126 m)	*Craie*	1343	242	20
METZ ROBERT (150 m)	*Chaourçois*	1249	266	20
MATHAUX (130 m)	*Briennois*	1352	259	21,4

Réseau de suivi de pousse de l'herbe

Pâturages suivis	Animaux pâturant	Hauteur d'herbe (cm)	Croissance (kgMS/Ha)
Saint Privé AB (89)	VL	11	35
Saint Privé (89)	VL	9	30
Diges (89)	VA	13,3	60
La Brosse (89)	VL	5,8	18
Soumaintrain (89)	VL	7,4	39
Vault de Lugny (89)	OV	7,6	33
Provency (89)	VA/OV	7,6	Pâturage
Ste Magnance (89)	VA	4	29
St Thibault (10)	VL	8,3	Pâturage
Chauffour les Bailly (10)	VL	11,5	59

Galega officinalis : une légumineuse toxique qui peut se retrouver dans vos foins

Pouvant mesurer jusqu'à 1 m de haut et ressemblant au sainfoin, elle se rencontre dans les **prairies humides à pH relativement élevé et les bords de chemins**. Sa floraison, stade à partir duquel elle devient toxique, se situe entre juin et septembre. Elle est mortelle pour les ruminants (bovins, ovins, caprins), ainsi que les chevaux. **Un fourrage avec 10 % de galega est considéré comme très dangereux**. La mort de l'animal survient alors moins de 24 heures après l'ingestion.

Description physique de la vivace : lien

C'est le moment de lutter contre les chardons

Vous pouvez principalement trouver 2 types de chardons invasifs dans vos parcelles :

Dessins : Yves Doux

Chardon des champs *Chardon commun*

Les dessins ne sont pas à l'échelle, le chardon commun est souvent plus grand et piquant que le chardon des champs.

Le **chardon des champs possède une partie souterraine très développée**. Il se propage localement par les racines et les rhizomes qui peuvent s'allonger de 2 à 4 m par an. Chaque mètre de racines peut donner naissance à environ 8 nouvelles pousses. **Si les pousses de l'année sont détruites au stade « rosette »**, des bourgeons secondaires se développent et **accentuent encore plus la colonisation**. C'est pourquoi il convient **d'attendre le stade bouton floral pour intervenir** (fauche ou herbicide).

Le **chardon commun est, lui, bisannuel**, il ne possède pas de reproduction végétative ce qui facilite sa destruction.

L'arrachage est donc efficace, on peut aussi le couper en-dessous du collet (c'est à dire à 10 cm de profondeur) avec une houe. **L'autre méthode consiste à faucher ce chardon au stade bouton** en même temps que le chardon des champs.

Stade « bouton floral »

Alysé
Rédaction : Ophélie COLLARD – Tel : 06.06.50.97.31
Jean-Claude CHUPIN – Tel : 06.66.54.96.13
Info Fourrages est disponible sur www.alyse-elevage.fr, www.aube.chambagri.fr, www.loiret.chambagri.fr,

l'Europe s'engage en Bourgogne
Agricultures & Territoires Chambres d'agriculture
Région Bourgogne Franche Comté
Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation