

## Les repères pour gérer les prairies

|  |                |                            |  |                                 |                         |   |            |
|--|----------------|----------------------------|--|---------------------------------|-------------------------|---|------------|
| Somme de températures cumulées depuis le 1 <sup>er</sup> février (base 0°-18°) | 250 à 350°C    | 500°C                      | 700 à 800°C                                      | 1000°C                          | 1200°C                  | 1400°C                                    | > à 1400°C |
|  | Mise à l'herbe | Fin déprimage<br>Épi à 5cm | Fauche précoce<br>Épi à 10cm -<br>Début épiaison | Foin précoce<br>Début floraison | Foin moyen<br>floraison | Foin tardif<br>médiocre Début<br>grainage | Grainage   |

### La pluviométrie repousse la mise à l'herbe

| Sommes de T° depuis le 1 <sup>er</sup> février et pluviométrie depuis le 1 <sup>er</sup> janvier et les 10 derniers jours. Données Météo - France |             |          |          |            |
|---|-------------|----------|----------|------------|
| Au 29 février   |             |          |          |            |
| Postes  | Secteur     | Cumul T° | Pluie mm | Pluie 10 j |
| GRANDCHAMP (180 m)  | Puisaye     | 242      | 144      | 24         |
| PERRIGNY (207 m)  | Auxerre     | 247      | 93       | 18         |
| SAINT MARDS (175 m)   | Pays d'Othe | 230      | 144      | 30         |
| ST ANDRE EN TP (300 m)  | Avallon     | 233      | 123      | 17         |
| MORVAN (400m) données estimées  | Quarré      | 215      |          |            |
| Au 25 février   |             |          |          |            |
| TROYES (126 m)  | Craie       | 213      | 88,6     | 31         |
| METZ ROBERT (150 m)   | Chaourçois  | 204      | 128      | 39         |
| MATHAUX (130 m)   | Briennois   | 213      | 118      | 38         |

### Mesure d'herbe

| Pâturages suivis            | Animaux pâturant | Type de prairie | Hauteur d'herbe (cm) |
|-----------------------------|------------------|-----------------|----------------------|
| Saint Privé AB (89)         | VL               | Temporaire      | 4,4                  |
| Saint Privé (89)            | VL               | Temporaire      | 3,5                  |
| Diges (89)                  | VA               | Naturelle       | 4,5                  |
| La Brosse (89)              | VL               | Temporaire      | 6,6                  |
| Soumaintrain (89)           | VL               | Temporaire      | 8,7                  |
| Vault de Lugny (89)         | OV               | Naturelle       | 6.7                  |
| Quarré-les-Tombes (89)      | VA               | Naturelle       | 3.7                  |
| Ste Magnance (89)           | VA               | Naturelle       | 3.9                  |
| St Thibault (10)            | VL               | Naturelle       | 10.5                 |
| Chauffour les Bailly (10)   | VL               | Naturelle       | 6.6                  |
| La Villeneuve-au-Chêne (10) | VL               | Naturelle       | 8.2                  |

2 profils se dessinent de nos différentes observations terrains :

- Une hauteur d'herbe importante (>10cm) sur les parcelles qui n'ont pas été exploitées depuis octobre 2019
- Une hauteur d'herbe conforme aux normales de saisons sur les parcelles ayant été exploitées en novembre 2019 ou en zone froide.

### Comment s'adapter à ce début du mois de mars humide ?

Même les terrains connus pour leur portance ne permettent pas, la plupart du temps, le pâturage sauf peut-être pour les petits ruminants. Retenez, que les **onglons des bovins ne doivent pas s'enfoncer de plus d'un tiers** auquel cas ils causeront des dommages irréversibles. Les prévisions météorologiques des 15 prochains jours ne font présages d'aucunes améliorations. On se dirige donc vers **un début du pâturage dans le meilleur des cas au 15-20 mars malgré un stock sur pied souvent conséquent** qui aurait permis un déprimage salutaire.

Dans le cas où le premier apport d'azote pour une première exploitation précoce n'a pas pu être épandu, il est désormais conseillé de fertiliser après la première exploitation (1<sup>er</sup> tour du pâturage ou fauche).

Dans une majorité de cas, il faudra prévoir **plus de récolte précoce mécanisée sur les surfaces pâturées dès la mi-avril**. Ces récoltes précoces permettront de rattraper une sortie des animaux trop tardive (par rapport au stade de pousse des graminées). En effet, le gaspillage de l'herbe sera conséquent au pâturage dans le cas d'une hauteur d'entrée dans les parcelles de plus de 14cm herbomètre.