

Les repères pour gérer les prairies

Somme de températures cumulées depuis le 1er février (base 0°-18°)	250 à 350°C	500°C	700 à 800°C	1000°C	1200°C	1400°C	> à 1400°C
	Mise à l'herbe	Fin déprimage Épi à 5cm	Fauche précoce Épi à 10cm - Début épiaison	Foin précoce Début floraison	Foin moyen floraison	Foin tardif médiocre Début grainage	Grainage

Fauche, semis : c'est parti !

Sommes de T° depuis le 1 ^{er} février et pluviométrie depuis le 1 ^{er} janvier et les 10 derniers jours.				
Sources : Chambre d'agriculture de l'Yonne et de l'Aube, d'après les données Météo-France				
Au 30 avril				
Postes	Secteur	Cumul T°	Pluie mm	Pluie 10 j
GRANDCHAMP (180 m)	Puisaye	708	267	20
PERRIGNY (207 m)	Auxerre	739	180	14
SAINT MARDS (175 m)	Pays d'Othe	712	220	18
ST ANDRE EN TP (300 m)	Avallon	699	238	16
MORVAN (400m) données estimées	Quarré	648		
Au 30 avril				
TROYES (126 m)	Craie	709	196	20
METZ ROBERT (150 m)	Chaourçois	690	231	17
MATHAUX (130 m)	Briennois	710	220	25

Les **700°C jour**, c'est à dire le **cumul de températures nécessaires pour des fauches précoces** est atteint presque partout. Problème majeur : il a beaucoup plu et la portance est limitante dans les terres profondes et non drainées.

La **récolte de méteils est à envisager si l'on veut obtenir de bonnes valeurs alimentaires**. Globalement, les seigles sont au stade début épiaison, il reste 1 feuille à sortir pour les triticales et 1 à 2 feuilles à sortir pour les avoines.

Les **luzernes initient leurs boutons floraux**, ceci ne sont pas encore visible sans une petite dissection. La **récolte pourra commencer dès cette semaine** mais en cas de dilemme, privilégiez la récolte de graminées, plus avancées en stade, plutôt que celle de la luzerne.



Mesures d'herbe

Pâturages suivis	Type de prairie	Croissance de l'herbe kgMS/Ha/jour
Lorris (45)	Temporaire	96
Lorris (45)	Temporaire	93
Douchy (45)	PT et Nat.	76
Sully-sur-Loire (45)	PT et Nat.	23
Saint-Privé AB (89)	Temporaire	77
Saint-Sauveur en Puisaye (89)	Temporaire	148
Saints (89)	Temporaire	98
Venoy (89)	Temporaire	63
Soumaintrain (89)	Temporaire	64
Quarré les tombes (89)	Naturelle	78
Sainte-Magnance (89)	Naturelle	92
Vanlay (10)	Naturelle	94
Saint Thibault (10)	Naturelle	141*
Chauffour-lès-Bailly (10)	PT et Nat.	153*
La Villeneuve-au-Chêne (10)	Naturelle	123*

*Mesures sur parcelle de fauche, pas encore récoltée

La pousse est repartie à la hausse cette semaine. La pousse journalière moyenne dépasse les 90 kg MS/ha/j. **Le stock d'herbe sur pied augmente**, y compris sur les sites en pâturage où les sorties des animaux ont été contraintes par la pluie et la portance des sols. **Si la hauteur à l'herbomètre est supérieure à 14 cm, il est préférable de faucher la parcelle pour éviter le gaspillage. Une hauteur de fauche à 8 cm est fortement conseillée** pour permettre une repousse plus abondante. La **longueur des limbes qui repousseront étant proportionnelle à la longueur de la gaine laissée.**

Longueur des limbes ≈ 2,3 fois la longueur de la gaine

