Les repères pour gérer les prairies

Somme de températures cumulées depuis le 1er février (base 0°-18°)	250 à 350°C	500°C	700 à 800°C	1000°C	1200°C	1400°C	> à 1400°C
	Mise à l'herbe	Fin déprimage Épi à 5cm	Fauche précoce Épi à 10cm - Début épiaison	Foin précoce Début floraison	Foin moyen floraison	Foin tardif médiocre Début grainage	Grainage

Une averse après l'autre

Sommes de T° depuis le 1er février et pluviométrie depuis le 1er janvier et les 10 derniers jours. Sources : Chambre d'agriculture de l'Yonne et de l'Aube, d'après les données Météo-France				
Au 10 mai				
Postes	**Secteur**	**Cumul T°**	**Pluie mm**	**Pluie 10 j**
GRANDCHAMP (180 m)	*Puisaye*	849	291	25
PERRIGNY (207 m)	*Auxerre*	887	202	21
SAINT MARDS (175 m)	*Pays d'Othe*	854	246	25
ST ANDRE EN TP (300 m)	*Avallon*	840	263	24
MORVAN (400m) *données estimées*	*Quarré*	784		
Au 7 mai				
TROYES (126 m)	*Craie*	807	201	6
METZ ROBERT (150 m)	*Chaourçois*	781	239	7
MATHAUX (130 m)	*Briennois*	808	229	9

La fenêtre météo de la semaine dernière a permis la récolte des derniers ray-grass. D'après les retours des différents conseillers Alysé, **Les RG qui avait pu être récolté au 20 avril ont de très bons rendements entre 3,5 et 4,5 TMS / Ha. Les RGI ou RGH récoltés la semaine dernière ont des rendements plus important de 30 % entre 5 et 5,5 TMS** mais avec des valeurs moindre puisque récoltés au stade début épiaison.

Les **luzernes n'évoluent finalement pas si rapidement que prévu** mais il faudra tout de même être réactif dès la prochaine opportunité. A l'heure actuelle le stade début bourgeonnement n'est pas encore atteint mais il ne saurait tarder.

Mesures d'herbe

Pâturages suivis	Type de prairie	Croissance de l'herbe kgMS/Ha/jour
Lorris (45)	Temporaire	91
Lorris (45)	Temporaire	74
Douchy (45)	PT et Nat.	53
Sully-sur-Loire (45)	PT et Nat.	49
Saint-Privé AB (89)	Temporaire	103
Saint-Sauveur en Puisaye (89)	Temporaire	120
Saints (89)	Temporaire	117
Venoy (89)	Temporaire	65
Soumaintrain (89)	Temporaire	50
Quarré les tombes (89)	Naturelle	68
Sainte-Magnance (89)	Naturelle	84
Vanlay (10)	Naturelle	NC
Saint Thibault (10)	Naturelle	24*
Chauffour-lès-Bailly (10)	PT et Nat.	73
La Villeneuve-au-Chêne (10)	Naturelle	92

**Peu représentatif, une seule parcelle de mesurée*

Les croissances de l'herbe sont encore très soutenues. **80 kg MS/ha/jour permettent un retour du pâturage sur une parcelle après seulement 18 jours de repos** (hormis si cette parcelle a été surpâturée --> pâturage en dessous de 5 cm de hauteur).

Le pâturage pourra commencer 2 semaines après la fauche, à condition que cette fauche ne soit pas été trop rase.

Rédaction : Ophélie COLLARD ; Matthieu JAVELLE ; Cléane HERNANDEZ
Info Fourrages est disponible sur www.alyse-elevage.fr, www.aube.chambagri.fr, www.loiret.chambagri.fr, www.yonne.chambagri.fr

AGRICULTURES & TERRITOIRES CHAMBRES D'AGRICULTURE

Méteil : quelle stratégie adopter ?

La **culture du méteil propose une multitude de possibilités concernant le type de mélange, les périodes de récoltes, l'objectif de rendement et de qualité…**
C'est la raison pour laquelle **nous avons suivis plusieurs parcelles de méteils en 2022 avec des stratégies différentes**. Nous vous avons résumées nos travaux sous la forme de **4 fiches techniques concernant 4 méteils différents, regroupées dans un fichier joint que vous trouverez dans la rubrique « Pour aller plus loin… » du même courriel qui vous a permis de lire cet *info-fourrages***.
Dans ces fiches, vous retrouverez le détail de l'itinéraire technique (semis, fertilisation, récolte), le rendement, la qualité et l'ensemble des coûts appliqués à la production du méteil et de la culture suivante.
Les 4 stratégies sont les suivantes :

- Méteil économique en intrants suivi d'une dérobée d'été
- Méteil équilibré avec semis sous couvert de prairie temporaire
- Méteil productif et équilibré suivi d'un maïs ensilage
- Méteil très précoce suivi d'un tournesol

Sorgho : les semis vont pouvoir commencer

Le sorgho doit être semé entre 2 et 3 cm de profondeur dans un sol réchauffé à 12°C et un peu humide. Le **travail du sol doit être minutieux** afin d'avoir une terre fine et bien rappuyée pour permettre un bon contact graine-sol.

Voilà pour les généralités, pour la suite **il faut distinguer si vous allez semer un sorgho monocoupe ou multicoupe**.

Multi coupe

	Type Sudan Grass	Type Hybride
Semoir Céréales	25 à 30 kg	20 à 25 kg
PMG très faible de 11 à 25gr. Très adapté au semis en dérobé car le cycle de végétation est très court.		

Source : Sorghum ID

Mono coupe
(en milliers)

	Inter rang	Usage ensilage	Usage industriel
Semoir monograine	40 à 50	210 à 250	230 à 270
	50 à 60	190 à 230	210 à 270
	60 à 80	180 à 220	200 à 240
Remarques	Majorer de 10% si les conditions de semis sont difficiles (mottes, semis direct,…)		

Source : Sorghum ID

Pour les sorghos monocoupes, l'inter-rang peut être compris entre 30 et 80 cm même si **l'optimal est de 40 à 60 cm**. Dans l'idéal, le semoir monograine permet d'assurer la meilleure qualité d'implantation mais le semis peut être également réalisé avec un semoir à céréales en fermant 1 rang sur 2.

AGRICULTURES & TERRITOIRES
CHAMBRES D'AGRICULTURE

Rédaction : Ophélie COLLARD ; Matthieu JAVELLE ; Cléane HERNANDEZ
Info Fourrages est disponible sur www.alyse-elevage.fr, www.aube.chambagri.fr, www.loiret.chambagri.fr, www.yonne.chambagri.fr