Alliance Expertise Élevage
Vous accompagner dans vos projets

Alysé
Pour la performance des éleveurs

INFO-FOURRAGES

13 octobre 2023

N° 19

Quelle est la valeur de l'herbe pâturée ?

Le pâturage d'automne permet **d'économiser des fourrages conservés ainsi que de la paille**. Les rotations des animaux sont également plus faciles à gérer à l'automne qu'au printemps car il n'y a pas de pic de pousse. **La quantité totale à exploiter à cette saison est estimée en moyenne entre 2 et 3 TMS/ha. Ce n'est pas négligeable si la portance est là, il faut en profiter !**

Les quantités sont présentes mais qu'en est-il de la qualité ?

Valeurs alimentaires d'échantillons d'herbe récoltés dans des prairies permanentes pâturées en Franche-Comté



Source : Groupe Herbe Franche-Comté

Les différentes études menées vont dans le même sens que le graphique ci-dessus. **L'herbe d'automne est un peu moins riche en énergie** puisque les végétaux sont un peu plus pauvres en sucre lié à la réduction de la photosynthèse. En revanche, **la concentration en protéine est un peu plus élevée qu'au printemps**, en particulier si ce dernier a été froid.

Mes animaux boudent le pâturage à l'automne, pourquoi ? Il peut arriver parfois que les animaux semblent moins enclins à pâturer à l'automne. Il y a deux raison principale à cela :

- La ration à l'auge est trop copieuse et/ou les animaux sont sortis trop tard le matin alors qu'ils ont déjà consommé trop de ration à l'auge. Elles sortent alors essentiellement pour se coucher.
- L'herbe est devenue peu appétente à cause de leur déjection. En effet, si elles ont tournées sur les différentes parcelles depuis le printemps et tout l'été. Il est fortement probablement que leur propre déjection rende repoussante l'herbe d'automne.

Mesures d'herbe

Pâturages suivis	Type de prairie	Croissance de l'herbe kgMS/Ha/jour
Douchy (45)	PT et Nat.	10
Saint-Privé AB (89)	Temporaire	0
St-Sauveur en Puisaye (89)	Temporaire	19
Saints (89)	Temporaire	2
Venoy (89)	Temporaire	9
Soumaintrain (89)	Temporaire	32
Quarré les tombes (89)	Naturelle	3
Sainte-Magnance (89)	Naturelle	0
Saint Thibault (10)	Naturelle	9
Chauffour-lès-Bailly (10)	PT et Nat.	10
La Villeneuve-au-Chêne (10)	Naturelle	15

Compte tenu des conditions climatiques séchantes, la pousse de l'herbe est très hétérogène. Sur terrain frais et profond, la pousse se maintient à un niveau faible de 10 à 20 kg MS/ha/j. Sur terrain séchant on constate une pousse nulle voir même parfois négative sur certaines parcelles.

L'affouragement redevient nécessaire pour assurer la bonne alimentation des animaux.

Pluviométrie du 01/10 au 10/10 *(D'après les données MétéoFrance)*

Grandchamp	1 mm
Auxerre-Perrigny	1 mm
Saint Mard	2 mm
Saint André en TP	3 mm
Troyes	0,6 mm
Metz-Robert	1 mm
Mathaux	4 mm

AGRICULTURES & TERRITOIRES CHAMBRES D'AGRICULTURE
RÉGION BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ

Rédaction : Ophélie COLLARD ; Matthieu JAVELLE ; Cléane HERNANDEZ
Info Fourrages est disponible sur www.alyse-elevage.fr, www.aube.chambagri.fr, www.loiret.chambagri.fr, www.yonne.chambagri.fr