

Ovin : le pâturage de couvert, une ressource supplémentaire !

Les **CIPAN** (Cultures Intermédiaires Pièges à Nitrate) et autres **couverts végétaux** sont une exigence réglementaire et ils sont implantés par de nombreux agriculteurs. Ceux-ci peuvent être pâturés par des ovins ce qui permettra de réduire les charges de l'atelier culture mais aussi de l'atelier ovin. La réussite et le rendement restent très dépendants des conditions climatiques estivales en particulier la pluviométrie. Environ un mois et demi après le semis, le couvert peut-être pâturé. **Il est conseillé de faire arriver les brebis « le ventre plein ».** Il n'est pas nécessaire de faire de transition alimentaire, ni un rationnement, les brebis peuvent pâturer sur des parcelles de grande superficie. Autre avantage, les couverts végétaux avec un précédent céréales sont des parcelles saines sans risque de parasitisme interne.

Dans le cas d'un échange, l'éleveur et l'exploitant de la surface doivent faire le point sur les modalités pratiques du pâturage pour l'intégrer à l'usage principal de la parcelle. Les parcelles mises à disposition doivent être visitées et chacun doit décider de ce qu'il est prêt à mettre en place en termes de périodes ouvertes au pâturage, d'équipements nécessaires (protections des cultures, abreuvement, abris, contention), de déplacement et de surveillance des animaux et de pratiques culturales (interventions, produits, périodes).

Rédaction : Marie Mauchossé – Conseillère ovin – 06 43 86 84 23



Pâturage de brebis dans un couvert de navette, radis, sorgho, tournesol, féverole, betterave, phacélie.



Pâturage de brebis dans une luzerne salie (dernière année d'exploitation).

Mesures d'herbe

Pâturages suivis	Type de prairie	Croissance de l'herbe kgMS/Ha/jour
Douchy (45)	PT et Nat.	8
Saint-Privé AB (89)	Temporaire	6,5
St-Sauveur en Puisaye (89)	Temporaire	8,5
Saints (89)	Temporaire	10
Venoy (89)	Temporaire	0
Soumaintrain (89)	Temporaire	13
Quarré les tombes (89)	Naturelle	9
Sainte-Magnance (89)	Naturelle	12
Saint Thibault (10)	Naturelle	NC
Chauffour-lès-Bailly (10)	PT et Nat.	NC
La Villeneuve-au-Chêne (10)	Naturelle	NC

Toujours de fortes pluviométries sur toute la région. **La croissance de l'herbe est faible voire nulle à cause des faibles températures.** La croissance de l'herbe est d'autant plus faible si la prairie est battue par le vent ce qui diminue la température ressentie de celle-ci.

Pluviométrie du 01/11 au 10/11 (D'après les données MétéoFrance)

Grandchamp	53 mm
Auxerre-Perrigny	35 mm
Saint Mard	41 mm
Saint André en TP	56 mm
Troyes	32 mm
Metz-Robert	45 mm
Mathaux	37 mm