

Les repères pour gérer les prairies

| | | | | | | | |
|--|----------------|-----------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|---|------------|
| Somme de températures cumulées depuis le 1 ^{er} février (base 0°-18°) | 250 à 350°C | 500°C | 700 à 800°C | 1000°C | 1200°C | 1400°C | > à 1400°C |
| | Mise à l'herbe | Fin déprimage Épi à 5 cm | Fauche précoce Épi à 10 cm - Début épiaison | Foin précoce Début floraison | Foin moyen floraison | Foin tardif médiocre Début grainage | Grainage |

Jamais plus de 3 jours sans pluie...

| Sommes de T° depuis le 1 ^{er} février et pluviométrie depuis le 1 ^{er} janvier et les 10 derniers jours. Sources : données Météo-France | | | | |
|--|-------------|----------|----------|-----------|
| Au 2 avril | | | | |
| Postes | Secteur | Cumul T° | Pluie mm | Pluie 7 j |
| TROYES (112 m) | Champagne | 566 | 216 | 27 |
| MATHAUX (130 m) | Briennois | 583 | 237 | 35 |
| METZ-ROBERT (140 m) | Chaourçois | 558 | 294 | 40 |
| ARCES (265 m) | Pays d'Othe | 531 | 350 | 37 |
| GRANDCHAMP (180 m) | Puisaye | 567 | 282 | 53 |
| PERRIGNY (207 m) | Auxerre | 591 | 238 | 41 |
| ST ANDRE EN TP (300 m) | Avallon | 543 | 315 | 50 |
| SAINT-LEGER VAUBAN (464 m) | Morvan | 461 | 460 | 77 |
| TONNERRE (200 m) | Tonnerrois | 567 | 325 | 48 |

La douceur fait avancer le stade de végétation des prairies rapidement. Les espèces précoces tel que les Ray-Grass Italien et hybride approchent du stade 2 nœuds (stade idéal de récolte).

Malheureusement, la pluie et l'humidité des sols ne permettent pas de récolter dans de bonnes conditions. Il est conseiller de ne pas récolter plutôt que de récolter un fourrage trop humide.

Un ensilage trop humide est un ensilage qui laissera échapper des jus (= pertes de nutriment) et qui n'arrivera pas à se stabiliser et donc qui chauffera. Il sera alors mal consommé par les animaux, pauvres en protéine et énergie. Pour rappel, l'herbe ensilée doit atteindre 30 % de matière sèche minimum pour ne pas couler.

En ce qui concerne les prairies naturelles ou mélange multi-espèces longue durée, la somme de températures idéale pour la récolte se situe autour de 700 degrés cumulés pour les animaux à fort besoin et 800 degrés cumulés pour les animaux à besoins modérés.

Mesures d'herbe

| Pâturages suivis | Type de prairie | Croissance de l'herbe kgMS/Ha/jour |
|-----------------------------------|-----------------|------------------------------------|
| Douchy (45) | PT et Nat. | 39 |
| Sully-sur-Loire (45) | PT et Nat. | 60 |
| St Privé AB (89) | Temporaire | 32 |
| St Privé (89) | Temporaire | 63 |
| Saints en Puisaye (89) | Temporaire | 54 |
| Treigny-Perreuse Ste Colombe (89) | Naturelle | 63 |
| Quarré les tombes (89) | Naturelle | 29 |
| Sainte-Magnance (89) | Naturelle | 68 |
| Venoy (89) | Temporaire | 37 |
| Soumaintrain (89) | Temporaire | 56 |
| Vanlay (10) | Naturelle | 31 |
| Saint Thibault (10) | Naturelle | 72 |
| Chauffour-lès-Bailly (10) | PT + Nat. | 40 |
| La Villeneuve-au-Chêne (10) | Naturelle | 39 |

Les croissances augmentent avec la douceur et une ressource en eau illimitée.

Les hauteurs de l'herbe atteignent souvent plus de 12 cm (herbomètre) lorsque le pâturage n'a pas encore été possible. Quand le moment sera venu, la fauche d'une partie des surfaces destinées au pâturage évitera les refus.

Pour les vaches laitières qui n'ont pas encore pu sortir, la fauche d'au moins la moitié de la surface pâturable permettra de ne pas se faire dépasser par l'herbe.

Pour les animaux allaitants et les génisses, n'hésitez pas à prévoir un chargement plus important d'environ 20 % si vous lâchez de bonne heure à l'habitude.

Exemple, vous savez qu'au printemps vous pouvez nourrir 8 génisses de 1 à 2 ans sur votre parcelle de 2 Ha. Si possible, n'hésitez pas cette fois à lâcher 10 génisses qui pourront pâturer jusqu'à ce que de nouvelles parcelles fauchées en foin ou enrubannage soit disponibles.

