Les repères pour gérer les prairies

Somme de températures cumulées depuis le 1er février (base 0°-18°)	250 à 350°C	500°C	700 à 800°C	1000°C	1200°C	1400°C	> à 1400°C
	Mise à l'herbe	Fin déprimage Épi à 5cm	Fauche précoce Épi à 10cm - Début épiaison	Foin précoce Début floraison	Foin moyen floraison	Foin tardif médiocre Début grainage	Grainage

Temps idéal pour les chantiers de fenaison

Sommes de T° depuis le 1er février et pluviométrie depuis le 1er janvier et les 10 derniers jours.
Sources : données Météo-France

Au 15 juin

Postes	Secteur	Cumul T°	Pluie mm	Pluie 10 j
TROYES (112 m)	*Champagne*	1442	239	41
MATHAUX (130 m)	*Briennois*	1515	258	59
METZ-ROBERT (140 m)	*Chaourçois*	1424	257	25
ARCES (265 m)	*Pays d'Othe*	1458	335	26
SAINT-PRIVE (198 m)	*Puisaye*	1448	270	29
PERRIGNY (207 m)	*Auxerre*	1506	250	36
ST ANDRE EN TP (300 m)	*Avallon*	1440	283	23
SAINT-LEGER VAUBAN (464 m)	*Morvan*	1348	390	33
TONNERRE (200 m)	*Tonnerrois*	1484	263	39

La semaine dernière, les conditions météo ont permis de faucher de nombreux hectares de foin. Ces fauches ont **eu lieu à un stade floraison des graminées (autour de 1200°C)** ce qui aura un impact sur la qualité des fourrages.

Pensez dès à présent à vos analyses de fourrages pour cet hiver.

Mesures d'herbe

Pâturages suivis	Type de prairie	Croissance de l'herbe kgMS/ha/jour
Sully sur Loire	Temporaire	0
Treigny (89)	Naturelle	9
Saint-Privé (89)	Naturelle	1
Saints-en-Puisaye (89)	Naturelle	3
Quarré les tombes (89)	Naturelle	25
Sainte-Magnance (89)	Naturelle	4
Venoy AB (89)	Temporaire	16
Soumaintrain (89)	Temporaire	NC
Les Croûtes (10)	Temporaire	6
Pel-et-Der (10)	Naturelle	41
Soulaines Dhuys (10)	Naturelle	11

Malgré les précipitations de ces derniers jours, **la croissance de l'herbe est au ralentit**. Les fortes chaleurs, actuelles et à venir, vont accentuer ce phénomène. **Limiter à tout prix le surpâturage (ou les fauches rases) afin d'éviter une augmentation de la température à la surface de la terre qui serait dommageable pour les fourragères.**

AGRICULTURES & TERRITOIRES
CHAMBRES D'AGRICULTURE

Rédaction : Ophélie COLLARD – Tel : 06.06.50.97.31
Amélie POULLEAU – Tel : 06.87.85.06.99

Info Fourrages est disponible sur www.alyse-elevage.fr, www.aube.chambagri.fr, www.loiret.chambagri.fr, www.yonne.chambagri.fr

L'analyse de fourrages : pourquoi ? comment ?

Il est essentiel de connaître la valeur de son stock fourrager afin de pouvoir ajuster la complémentation distribuée à votre cheptel au cours de l'hiver.

Pour les **fourrages récoltés sous forme de ballot**, les prélèvements doivent être réalisés sur plusieurs balles d'un même lot (minimum 5 balles). Sur balle **ouverte, prélever au moins 10 poignées à différents endroits dans toutes les couches.** Les prélèvements simples sont ensuite rassemblés, homogénéisés pour obtenir un échantillon représentatif d'environ 500 g frais.

Pour les **fourrages stockés en silo ou taupinière**, il faut attendre que la pente de l'ensilage soit consommée et prélever plusieurs poignées à différentes hauteurs sur le front d'attaque.

N'hésitez pas à contacter un conseiller Alysé pour la réalisation de votre échantillon. Les résultats des valeurs fourragères vous parviendront entre 1 à 2 semaines après le prélèvement.

Prairies : Optimiser la valorisation des 2èmes coupes

Pour ceux qui ont fait une coupe d'ensilage ou d'enrubannage début mai, vous devez décider dès maintenant **du devenir des repousses en fonction de votre sécurité sur votre pâturage**. Après la première coupe, les graminées entament une nouvelle phase de croissance avec le développement de nouvelles feuilles.

A cette saison, **il faut 8 à 10 jours pour produire une nouvelle feuille (150 °C cumulés).**

La durée de vie de cette feuille (avant son jaunissement) est de 5 à 7 semaines (800° cumulés pour nos prairies naturelles : vulpin des prés, flouve odorante, agrostide, houlque laineuse, pâturin (…) et moins de 600 °C pour un RGA).
La plupart de ces graminées ne vont pas remonter à épis, **vous n'aurez que des repousses feuillues**. L'enjeu est donc d'intervenir avant que les premières feuilles commencent à mourir soit au **plus tard 50 à 60 jours après la première coupe.**

Rappel : A partir de 30°C (25°C pour les RGA), les graminées se mettent en dormance estivale : arrêt de la croissance. Un retour des fortes chaleurs pourrait impacter significativement vos pâtures. L'objectif de sécuriser vos stocks ne doit pas faire oublier que **la première économie en termes de récolte est le pâturage.**

Rédaction : Ophélie COLLARD – Tel : 06.06.50.97.31
Amélie POULLEAU – Tel : 06.87.85.06.99

Info Fourrages est disponible sur www.alyse-elevage.fr, www.aube.chambagri.fr, www.loiret.chambagri.fr, www.yonne.chambagri.fr