

INFO-FOURRAGES

19 juin 2026
Numéro 12

Les repères pour gérer les prairies

Somme de températures cumulées depuis le 1 ^{er} février (base 0°-18°)	300 à 350°C	500°C	700 à 800°C	1000°C	1200°C	1400°C	> à 1400°C
	Mise à l'herbe	Fin déprimage Épi à 5cm	Fauche précoce Épi à 10cm - Début épiaison	Foin précoce Début floraison	Foin moyen Floraison	Foin tardif Début grainage	Grainage

Conditions séchantes et (très) fortes chaleurs

Sommes de T° depuis le 1^{er} février et pluviométrie depuis le 1^{er} janvier et les 10 derniers jours.

Sources : données Météo-France

Au 13 juin

Postes	Secteur	Cumul T°	Pluie mm	Pluie 10 j
TROYES (112 m)	Champagne	1526	218	4
MATHAUX (130 m)	Briennois	1570	263	13
METZ-ROBERT (140 m)	Chaourçois	1481	277	14
ARCES (265 m)	Pays d'Othe	1537	413	9
SAINT-PRIVE (198 m)	Puisaye	1540	288	3
PERRIGNY (207 m)	Auxerre	1594	218	6
ST ANDRE EN TP (300 m)	Avallon	1535	261	12
SAINT-LEGER VAUBAN (464 m)	Morvan	1420	396	15
TONNERRE (200 m)	Tonnerrois	1561	268	8

Peu de pluies sont tombées ces deux dernières semaines sur notre région. Les sols s'assèchent et les très fortes températures prévues ces prochains jours vont être difficiles pour les animaux et la végétation.

Côté animaux, les consommations d'eau vont doubler. Une vache laitière aura besoin jusqu'à 160 L d'eau par jour, une vache allaitante suitée jusqu'à 110 L et une brebis jusqu'à 6 L.

Au niveau capacité des abreuvoirs :

- S'il est à **moins de 200 m** de la zone pâturée : 10% du lot devra pouvoir s'abreuver en même temps et le débit devra fournir 25% du besoin quotidien en 10 minutes.
- S'il est à **plus de 200 m** de la zone pâturée : 20% du lot devra pouvoir boire en même temps et le débit devra fournir 50% du besoin quotidien en 10 minutes.

Côté végétation, le plus important est d'éviter à tout prix de raser les pâtures. C'est en partie pour cela, que l'on conseille de **faucher à 8 cm de hauteur**. Il faut également **se prémunir du surpâturage**, ne pas hésiter à affourager pour que les animaux n'épuisent pas le couvert. **Un couvert encore présent permet de protéger le sol.**

Lorsque le couvert prairiale était ras, une étude de la chambre d'agriculture du lot a enregistré des températures à 2 cm de profondeur dans le sol allant jusqu'à 60°C (= température d'une cuisson douce au four). Sous 8 cm d'herbe, la température était bien inférieure.

Mesure d'herbe

Courbe de la pousse de l'herbe en 2025 et 2026
(17 élevages en mesure)



On s'y attendait, la pousse de l'herbe dégringole jusqu'à son plus bas niveau depuis le mois de mars. **Seulement 10 kg MS / Ha / jour de moyenne, la croissance devrait même être nulle ces deux prochaines semaines.**

Au-dessus de 30°C, toutes les graminées prairiales stoppent leur croissance ajouter à cela un stress hydrique important et vous obtenez des prairies à l'arrêt. **L'important à cette période c'est de tout faire pour éviter de perdre en densité de végétation** (voir conseil ci-dessus).

INFO-FOURRAGES

Après la moisson, quel couvert fourrager semer ?

Compte tenu des prévisions météorologiques, **la moisson devrait vite se terminer laissant des parcelles libres dès début juillet**. Si vous souhaitez semer des couverts qui peuvent être valoriser en fourrage (et avec de bonnes valeurs alimentaires !) les espèces ci-dessous pourront vous correspondre.

Espèces	Dose de semis	Informations	Prix indicatif
Sorgho multicoupes	20 à 25 kg / Ha	Exploitation : ensilage, enrubannage ou pâturage (hauteur > à 60 cm). A récolter avant épiaison pour de meilleures valeurs alimentaires. En semant en juillet, une seule coupe sera réalisée.	2 à 3 euros / kg
			
Avoine rude	35 à 40 kg / Ha	Exploitation : ensilage ou pâturage. Pas de repousses. Association possible avec des trèfles annuels (Incarnat, Alexandrie) et/ou des vesces.	1,5 à 2 euros / kg
			
Teff grass	5 à 10 kg / Ha	Exploitation : ensilage, enrubannage, foin ou pâturage. Attention graine extrêmement petite , à semer en surface et bien rappuyer. Déclencher la coupe lorsque le teff fait environ 45/50 cm de haut. Ne pas attendre plus car il a tendance à verser. Récolte possible 40 jours après semis. Multicoupe possible.	5 euros / kg
			
Colza fourrager	10 kg / Ha	Exploitation : pâturage, affouragement vert. Ensilage déconseillé car trop humide (beaucoup de pertes en jus). Fourrage riche en protéine (jusqu'à 19 % de MAT/kg de MS).	3 à 4 euros / kg
			