

Canicule et sécheresse : le système fourrager souffre !

Sommes de T° depuis le 1^{er} février et pluviométrie depuis le 1^{er} janvier et les 10 derniers jours.

Sources : données Météo-France

Au 29 juin

Postes	Secteur	Pluie mm	Pluie 10 j
TROYES (112 m)	Champagne	222	3
MATHAUX (130 m)	Briennois	294	32
METZ-ROBERT (140 m)	Chaourçois	302	23
ARCES (265 m)	Pays d'Othe	431	16
SAINT-PRIVE (198 m)	Puisaye	303	8
PERRIGNY (207 m)	Auxerre	226	8
ST ANDRE EN TP (300 m)	Avallon	279	18
SAINT-LEGER VAUBAN (464 m)	Morvan	422	27
TONNERRE (200 m)	Tonnerrois	274	5

La semaine dernière nous avons atteint des records de températures sur nos départements. Les fortes chaleurs combinées au manque de précipitations entraînent des conséquences sur vos prairies et vos cultures fourragères : croissances quasi nulles voire une perte du couvert avec des fourrages qui grillent sur place.

Des orages d'intensité variables sont passés sur l'ensemble de notre territoire le week-end dernier : de 3 mm à 30 mm de pluies sont tombés.

Maïs au stade début floraison dans le nord du Cher. Comme celui-ci, beaucoup de maïs auront une taille modeste comprise entre 1m50 et 1m70 →



Point sur les maïs

Les maïs subissent de plein fouet les conditions météorologiques. **Leurs développements inquiètent mais dans une très grande majorité de cas, aucune décision de récolte ne doit être prise. Tant qu'ils sont verts (aller les voir préférentiellement le matin pour ne pas se faire peur), il faut attendre le résultat de la fécondation.** Ci-dessous, vous trouverez les dates approximatives de floraison (= sorties des soies) en fonction de la date de semis. Il faudra ensuite patienter environ 15 jours pour observer le taux de remplissage des grains. Une prochaine publication vous sera envoyée dans 10 jours à ce sujet, pour vous aider à prendre la meilleure décision possible.

Date de semis	Date de floraison moyenne
Entre le 1 ^{er} et le 10 avril	28 juin
Entre le 10 et 20 avril	2 juillet
Entre le 20 et 30 avril	7 juillet
Entre le 1 ^{er} et le 10 mai	12 juillet



Malheureusement, peu d'espoir pour ce maïs.

Mesure d'herbe

Courbe de la pousse de l'herbe en 2025 et 2026
(17 élevages en mesure)



La croissance moyenne de la pousse de l'herbe reste sous la barre des 10 kg MS/ha/jour.

Seules les prairies exploitées avant le 15 mai ont produit des repousses qui peuvent encore être consommées afin de prolonger le pâturage.

Les repousses après les foin, même ceux réalisés il y a 1 mois, ne sont souvent pas assez importantes pour permettre un réel pâturage. L'affouragement des animaux au pré va commencer...

INFO-FOURRAGES

Des solutions à envisager pour préserver votre système fourrager et votre cheptel

L'herbe grille, jaunit et les parcelles sont très souvent surpâturées. Même si des pluies significatives venaient à faire leur apparition (plus de 30 mm), la repousse de l'herbe serait longue (3 à 4 semaines) et ce d'autant plus que nous arrivons en pleine période estivale. Malgré cette situation délicate à gérer, quelques préconisations sont recommandées pour limiter les dégâts :

Bloquer les lots d'animaux sur une parcelle « parking »

Il vaut mieux avoir un surpâturage sur une petite parcelle que sur l'ensemble du dispositif. Pour ceux qui pratiquent le pâturage continu, bloquer les animaux dans un coin de la parcelle à l'aide d'un fil électrique. Cela permettra un redémarrage plus rapide de la pousse de l'herbe dès les premières pluies sur les parcelles non pâturées.

Complémenter les jeunes veaux pour compenser le manque d'herbe et la baisse de la production de lait des mères

Si ce n'est pas déjà le cas, réorganiser les lots selon le sexe des veaux pour ne compléter que les veaux mâles s'ils sont destinés à la vente en brouards. Distribuer de façon rationnée 2 à 4 kg d'un mélange céréales - tourteaux par veau et par jour. Attention de bien avoir une place à l'auge pour tous les veaux ! Si la sécheresse se poursuit, généraliser la complémentation aux veaux femelles sans toutefois dépasser 2 kg/veau/jour.

Sevrer précocement les veaux

Dans les systèmes naisseur-engraisseur, le sevrage précoce peut s'envisager à condition que les animaux pèsent au-delà de 250 kg de poids vif à un âge minimum de 5 mois. Les résultats à l'engraissement ne seront pas affectés par rapport à un sevrage normal. Les vaches tarées peuvent alors être bloquées sur une parcelle et nourries par affouragement au pré.

Anticiper les ventes

Pour les animaux en fin de finition (vaches de réforme, génisses) ou pour des vaches ou génisses prévues à réformer (échographier les animaux mis à la reproduction si besoin), envisager une vente anticipée en fonction de la demande du marché, afin de diminuer les besoins en stocks ou en surface pâturée.

Gérer les repousses après le retour des pluies

Le retour de pluies si elles sont suffisamment conséquentes sur des sols chauds va favoriser le redémarrage de la pousse de l'herbe et permettre une reprise du pâturage. Par contre, il sera nécessaire de laisser aux prairies le temps de reverdir et d'accumuler suffisamment de hauteur d'herbe (10 cm minimum) avant de les faire pâturer permettant ainsi de prolonger le pâturage tard en arrière-saison. Aucun apport d'azote minéral n'est à prévoir car il ne serait que peu ou pas valorisé : le retour des pluies favorisera la minéralisation de la matière organique du sol.

Implantation de couvert dérobées d'été

Une implantation de cultures dérobées après moisson peut permettre de sécuriser son stock fourrager. Le coût de semences est plus ou moins élevé et la réussite du couvert dépendra des conditions climatiques.

Les associations vesce - avoine - trèfle d'Alexandrie assurent une certaine régularité pour la MAT (17 à 20 %), avec une valeur UFL correcte.

Les mélanges Moha-Trèfles sont plus productifs car plus résistants à la chaleur, mais avec aussi de l'hétérogénéité... Cependant, la valeur alimentaire est nettement plus basse (épiaison rapide).

Les sorghos sont intéressants si l'on cherche du stock avec des valeurs correctes.

Type d'association	Coût/ ha	Ensilage (tMS/ ha)	MAT (%)	UFL
DÉROBÉES D'ÉTÉ Céréales (56%)- Vesce – Trèfles (A;s;p)	67 (58 – 70)	2,4 (0,3 – 4,5)	19,8 (17,1 – 24,5)	0,91 (0,78 – 0,98)
Sorgho F – Trèfles	103	2,6	13,6 (10,8-16,4)	0,84 (0,78-0,9)
Sorgho F – Pois – Trèfles	133	2,1 (0,88-3,3)	13,9	0,81
Moha – Trèfles	67 (61 – 83)	3,3 (1,3 – 5,2)	13,9 (11,4 – 17,5)	0,78 (0,74 – 0,81)

Résultats de 5 années d'essais CA71 au lycée de Fontaines