

INFO-FOURRAGES

13 mai 2025
Numéro 8

Les repères pour gérer les prairies


Somme de températures cumulée depuis le 1 ^{er} février (base 0°-18°)	250 à 350°C	500°C	700 à 800°C	1000°C	1200°C	1400°C	> à 1400°C
	Mise à l'herbe	Fin déprimage Épi à 5cm	Fauche précoce Épi à 10cm - Début épiaison	Foin précoce Début floraison	Foin moyen floraison	Foin tardif médiocre Début grainage	Grainage

Large fenêtre météo à venir

Sommes de T° depuis le 1 ^{er} février et pluviométrie depuis le 1 ^{er} janvier et les 10 derniers jours. Sources : données Météo-France				
Au 10 mai				
Postes	Secteur	Cumul T°	Pluie mm	Pluie 10 j
TROYES (112 m)	Champagne	891	169	20
MATHAUX (130 m)	Briennois	934	164	8
METZ-ROBERT (140 m)	Chaourçois	863	190	15
ARCES (265 m)	Pays d'Othe	900	265	14
SAINT-PRIVE (198 m)	Puisaye	882	202	6
PERRIGNY (207 m)	Auxerre	930	173	3
ST ANDRE EN TP (300 m)	Avallon	873	199	9
SAINT-LEGER VAUBAN (464 m)	Morvan	819	288	1
TONNERRE (200 m)	Tonnerrois	914	180	7

Les 1000°C cumulées seront atteints cette semaine sur l'ensemble de nos départements. Il correspond au stade **épiaison des graminées qui permet d'envisager les récoltes en foin**. L'année passée, la quantité était au rendez-vous mais cette année les éleveurs visent en majorité la qualité. Si la **large fenêtre météo se confirme le foin pourra être réalisé dès cette semaine**.

Pour Les prairies constituées en grande majorité d'espèces difficiles à sécher tel que des Ray-grass et/ou des trèfles, privilégiez l'enrubannage au foin.



Mesures d'herbe

Pâturages suivis	Type de prairie	Croissance de l'herbe kgMS/ha/jour
Sully sur Loire	Temporaire	36
Treigny (89)	Naturelle	64
Saint-Privé (89)	Naturelle	73
Saints-en-Puisaye (89)	Naturelle	49
Quarré les tombes (89)	Naturelle	54
Sainte-Magnance (89)	Naturelle	38
Venoy AB (89)	Temporaire	34
Soumaintrain (89)	Temporaire	82
Les Croûtes (10)	Temporaire	27
Pel-et-Der (10)	Naturelle	36
Soulaines Dhuys (10)	Naturelle	18

Le manque de pluie commence à se faire sentir par endroit. Les prairies continuent tout de même à **intensifier leur croissance avec un pousse entre 50 et 80 kg MS/Ha/jour dans la plupart des situations**.



INFO-FOURRAGES

Conseil pour une récolte de foin de qualité

La fauche

Elle est possible dès que la météo annonce au moins 5 jours de beau temps sans aucune perturbation. Il est conseillé de **faucher dès la levée de la rosée**. **Faucher à une hauteur de 6-8 cm**, afin d'éviter d'incorporer de la terre, de permettre une meilleure repousse et l'aération du fourrage par le dessous.

Le fanage

C'est le premier jour que la plante perd le plus d'humidité : elle passe de 20 à plus de 50 % de matière sèche. **L'objectif est que l'herbe reste le moins de temps possible au sol. Faner tout de suite après la fauche pour que l'herbe sèche rapidement.** Si le temps est beau, il est possible de faire deux fanages le jour de la fauche. **Le fanage ne doit pas être trop agressif.** Plus l'herbe sèche et se fragilise, plus il faut augmenter la vitesse du tracteur et diminuer le régime de rotation des toupies afin d'obtenir un fanage de plus en plus doux. Par la suite, **réaliser un fanage à chaque fois qu'il y aura une différence nette d'humidité entre le dessus et le dessous de la couche de fourrage.**

En présence de légumineuses, fanez le matin pendant la rosée : quand les roues avant du tracteur ne sont plus humides ou quand vous commencez à entendre l'herbe craquer dans les toupies, il est temps d'arrêter.

Le pressage

Presser un foin suffisamment sec, avec **une teneur en matière sèche d'au moins 85 %** sinon le foin va chauffer et sa valeur alimentaire va chuter.

Pour cela, il faut apprendre à apprécier la teneur en matière sèche au champ :

- 65 % MS : certaines feuilles deviennent cassantes
- 70 à 75 % MS : le foin paraît sec, sauf sous les andains
- 80 à 85 % MS : le fourrage est craquant

Si le foin n'est pas impeccablement sec, et que la pluie menace, bottez quand même en diminuant la pression de serrage et en faisant des « cœurs de botte en étoile ».

Le stockage

Pour des foins pressés humides, après avoir laissé 3 semaines les balles au champ, rentrez-les mais sans les empiler, pour **éviter tout « effet cheminée »** qui à la moindre chauffe, pourrait embraser le stock de foin et le hangar. Les balles les plus humides doivent être conservées à l'extérieur.

La **température interne de la balle** est un bon indicateur de son taux d'humidité. **En dessous de 45°C la température est normale**, il n'y a pas de reprise de fermentation et la botte peut être stockée. La température peut être prise 2 jours après pressage par beau temps et 7 à 10 jours si le temps est humide et que le séchage au sol a duré en longueur.

