

Les repères pour gérer les prairies

Somme de températures cumulées depuis le 1 ^{er} février (base 0°-18°)	250 à 350°C	500°C	700 à 800°C	1000°C	1200°C	1400°C	> à 1400°C
	Mise à l'herbe	Fin déprimage Épi à 5cm	Fauche précoce Épi à 10cm - Début épiaison	Foin précoce Début floraison	Foin moyen floraison	Foin tardif médiocre Début grainage	Grainage

5 jours de beau temps et les foins pourront se faire !

Le topping : la remise à plat de votre système pâturant

En mai, entre le 3 et 4^{ème} tour de pâturage, vous pouvez observer deux phénomènes qui gênent la gestion de vos pâtures :

- Des zones de refus importantes héritées d'anciens passages
- Des graminées montées à épis

Vous pouvez alors envisager la technique du topping qui consiste à **faucher l'herbe d'une parcelle la veille ou le matin même avant de la faire pâturer**. Après avoir légèrement séchée sur place, l'herbe est consommée directement par le troupeau. L'herbe est sectionnée de manière nette et recommence tout de suite à pousser de manière homogène sur toute la parcelle. Il n'y aura ainsi ni épiaison, ni présence de refus, ni zone de surpâturage pour le cycle suivant. Autre avantage, le topping peut également aider à maîtriser les rumex et chardons qui sont sensibles à la fauche à cette période. La **consommation d'herbe par les animaux sera légèrement supérieure puisque les animaux ne trient pas et que l'herbe sera encore plus accessible**. La valeur du fourrage, sera semblable, à stade de développement équivalent, à de l'herbe sur pied.



Photographie prise 4 jours après le pâturage du topping par des vaches laitières. Très peu de refus et une pâture prête à redémarrer →

Sommes de T° depuis le 1^{er} février et pluviométrie depuis le 1^{er} janvier et les 10 derniers jours.
Sources : données Météo-France

Au 20 mai

Postes	Secteur	Cumul T°	Pluie mm	Pluie 10 j
TROYES (112 m)	Champagne	1036	170	1
MATHAUX (130 m)	Brienois	1085	166	2
METZ-ROBERT (140 m)	Chaourçois	1007	196	7
ARCES (265 m)	Pays d'Othe	1046	276	12
SAINT-PRIVE (198 m)	Puisaye	1025	208	7
PERRIGNY (207 m)	Auxerre	1076	189	15
ST ANDRE EN TP (300 m)	Avallon	1017	222	23
SAINT-LEGER VAUBAN (464 m)	Morvan	950	318	19
TONNERRE (200 m)	Tonnerrois	1061	192	12

Mesures d'herbe

Pâturages suivis	Type de prairie	Croissance de l'herbe kgMS/ha/jour
Sully sur Loire	Temporaire	35
Treigny (89)	Naturelle	30
Saint-Privé (89)	Naturelle	37
Saints-en-Puisaye (89)	Naturelle	22
Quarré les tombes (89)	Naturelle	23
Sainte-Magnance (89)	Naturelle	15
Venoy AB (89)	Temporaire	23
Soumaintrain (89)	Temporaire	NC
Les Croûtes (10)	Temporaire	49
Pel-et-Der (10)	Naturelle	23
Soulaines Dhuys (10)	Naturelle	10